Computerphysik II

Teil 1 - Statistik und Datenanalyse

S. Gerlach

WiSe 2020/21

Universität
Konstanz

INHALT

1. Kombinatorik
2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen
3. Numerische Integration
4. Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen
5. Schätzmethoden und Anpassung von Funktionen

Permutation: Anordnung von n Elementen ($n = 3$: 123, 132, 321, 213, 231, 312, 321)

Anzahl:

$$P_n = n!$$

Anzahl mit Wdh.:

$$P_n = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

Berechnung:

$n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ (iterativ)

$n! = n(n-1)!$ (rekursiv)

In Python: `math.factorial(int)`

Für große n (Striling-Formel):

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

bzw. $\lg(n!) \approx n(\ln n - 1)$.

Anwendungen Fakultät:

- ▶ Binomialkoeffizient (siehe Kombination)
- ▶ Binomischer Lehrsatz
- ▶ Pascalsches Dreieck
- ▶ Exponentialfunktion ($\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$)
- ▶ Taylorreihe
- ▶ Leibniz-Produktregel
- ▶ ...

Variation: Auswahl von k aus n Elementen (2 aus 3: 12, 13, 21, 23, 31, 32)

Reihenfolge wichtig

Anzahl:

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Anzahl mit Wdh.:

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Kombination: Auswahl von k aus n Elementen (2 aus 3: 12, 13, 23)

Reihenfolge egal

Anzahl:

$$C_{n,k} = \frac{V_{n,k}}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

```
1 from scipy.misc import comb
2 print ("%d über %d =" % (n, k), comb(n, k, exact=True))
```

In Python: `itertools` (s. Übung)

Tipp: `list(...)` erzeugt eine iterierbare Liste

Catalan-Zahlen

<https://de.wikipedia.org/wiki/Catalan-Zahl>

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

$$C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2} C_n$$

Zuerst: Zufallsexperimente mit diskreter Anzahl an Ergebnissen.

1. Beispiel: **Binomialverteilung**

Mit welcher Wahrscheinlichkeit gibt es k positive Ergebnisse bei n Versuchen eines Bernoulli-Experiments ("Münzwurf")?

$$P(k) = B_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Mit $k = 0, \dots, n$. $\binom{n}{k}$ ist die Anzahl der Kombinationen, da egal ist, wann die positiven Ergebnisse auftreten.

Ideale Münze ($p = 1/2$): $P(k) = \binom{n}{k} \frac{1}{2}^k \frac{1}{2}^{n-k} = \frac{1}{2^n} \binom{n}{k} = \frac{C_{n,k}}{V_{n,2}}$

Binomialverteilung

```
1 from scipy.stats import binom
2 import pylab as pl
3
4 x=pl.arange(-n,n+1,1)
5 pl.bar(x, binom.pmf(x,n,p), width=0.4, align="center")
```

Kumulative Binomialverteilung

Wieviele Ereignisse sind kleiner als ein Wert k_0 : Summierte Wahrscheinlichkeit

$$F_K(k_0) = P(K < k_0) = \sum_{k=0}^{\lfloor k_0 \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

1 `pl.bar(x, binom.cdf(x, n, p), width=0.4, align="center")`

Eigenschaften:

- ▶ Normierung: $\sum_{k=0}^n P(k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \stackrel{\text{binom. Lehrsatz}}{=} (p + (1-p))^n = 1$
- ▶ Erwartungswert: $\mu = \langle k \rangle = \sum_{k=0}^n k P(k) = \dots = np$
(= Summe der einzelnen Erwartungswerte)
- ▶ Varianz: $\sigma^2 = \sum_{k=0}^n (k - \mu)^2 P(k) = \langle (x - \mu^2) \rangle = \dots = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \dots = np(1-p)$.

Damit ist die relative Breite:

$$\frac{\sigma}{\mu} = \sqrt{\frac{1-p}{n-p}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

D.h. Erwartungswert lässt sich für $n \rightarrow \infty$ beliebig genau bestimmen.

1. Qualitätssicherung:

Situation: Produkte am Fließband sollen kontrolliert werden.

Gesucht ist die Fehlerquote p .

Idee: Messe Wahrscheinlichkeit für Null Fehler bei Auswahl von jeweils n Teilen:

$$W(p) = P(0) = B_{n,p}(k=0) = (1-p)^n$$

Damit

$$p = 1 - \sqrt[n]{P(0)}.$$

Beispiel: $n = 3$, gemessen $P(0) = 0,25 \rightarrow p = 0,37$.

2. Ising-Spinkette: s. Buch S. 248

Grenzfall $n \rightarrow \infty$ bei konstantem Erwartungswert $\lambda = np$ (d. h. $p \rightarrow 0$):

$$P_{\lambda}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Poissonverteilung

Anwendung: viele, aber seltene Ereignisse

```
1 from scipy.stats import poisson  
2 pl.bar(x, poisson.pmf(x, l), width=0.4, align="center")
```

Eigenschaften:

- ▶ Normierung:

$$\sum_{k=0}^n P(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

- ▶ Erwartungswert: $\mu = \sigma^2 = \dots = \lambda$

Relative Breite: $\frac{\sigma}{\mu} \approx \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$.

Poissonverteilung - Beispiel 1 - Blitzeinschläge

Im Mittel wurden 0,1 Blitzeinschläge pro Hektar in Deutschland registriert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit schlägt kein, ein, zwei, ... Blitze auf einen Hektar ein?

$$\mu = 0,1 = \lambda$$

→ 90% kein Einschlag, 10% ein Einschlag.

Poissonverteilung - Beispiel 2 - Schachbrett

Es regnet auf ein Schachbrett. Wieviele Tropfen sind in einem Feld?

$N = 64$ Felder, $n = 100$ Tropfen: $\lambda = \mu = n/N \approx .1, 56$:

Immerhin mit 5% Wahrscheinlichkeit 4 Regentropfen im Feld.

Poissonverteilung - Beispiel 3 - Radiaktiver Zerfall

Die Zerfälle pro Zeiteinheit Δt folgen für $\Delta t \ll t_H$ der Poissonverteilung mit $\lambda = pN$. $p \approx \alpha\Delta t$ ist die Wahrscheinlichkeit für einen Zerfall, N die Anzahl der Teilchen.

Beispiel: $N = 10^{18}$ Atome, $t_H = 4,5$ Mrd. Jahre. Damit $\alpha = \ln 2/t_H$ und für $\Delta t = 1$ s:

$$\lambda = \alpha N \Delta t \approx 7.$$

Es gibt also im Mittel 7 Zerfälle pro Sekunde mit der Verteilung:

Mehr Beispiele: Übungsblatt

Diskrete Verteilungen oft unhandlich. Betrachte Grenzfälle:

$$\begin{array}{ccc} \text{Binomialverteilung} & \xrightarrow[\mu=np=\text{const}]{n \rightarrow \infty} & \text{Poissonverteilung} \\ n \rightarrow \infty \downarrow & & \downarrow \lambda \rightarrow \infty \\ \text{Normalverteilung} & \text{=====} & \text{Normalverteilung} \end{array}$$

→ Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Um mit kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu arbeiten, müssen wir nun nicht mehr Summieren, sondern integrieren. Numerisch brauchen wir dafür die **Numerische Integration**.

Dafür sind wichtig:

- ▶ Newton-Cotes-Formeln und Zusammengesetzte Formeln
- ▶ Uneigentliche Integrale
- ▶ Gauß-Quadratur

→ siehe Buch Kapitel 9.5

Num. Integration - Beispiel: Kurvenlänge einer Ellipse

Mit $\gamma(t) = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{pmatrix}$ ($t \in [0, 2\pi]$):

$$|\gamma(t)| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = a\sqrt{1 - \varepsilon^2 \cos^2 t}.$$

Damit ist die Kurvenlänge:

$$L = \int_0^{2\pi} |\gamma(t)| dt = 4a \underbrace{\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \varepsilon^2 \cos^2 t} dt}_{E(\varepsilon^2), \text{Elliptisches Integral}}.$$

Num. Integration - Beispiel: Periodendauer des math. Pendels

$$T = \frac{4}{\omega} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\varphi_0}{2} \sin^2 \varphi}} d\varphi = \frac{4}{\omega} K(\sin^2 \frac{\varphi_0}{2}).$$

`scipy.special.elliptic(k**2)`

→ siehe Buch Kapitel 18.1.3

- ▶ Exponentialverteilung (Buch)
- ▶ Lorentz-Verteilung
- ▶ Normalverteilung (Buch)

Beispiele: Maxwell-Boltzmann (Buch)

Mehr Beispiele: Übung

Lorentz-Verteilung

(In der Mathematik: Cauchy-Lorentz-Verteilung)

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{\gamma^2 + (x - x_0)^2}$$

Ursprung: Fourier-Trafo vom exp. Zerfall

Daher bekannt aus: Resonanzkurve, Spektrallinie,

"Breit-Wigner"-Resonanz

Eigenschaften:

▶ Erwartungswert: $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \infty!$

▶ Varianz: $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \infty!$

Verwende daher Median x_0 und FWHM (*full width half maximum*)

$\Gamma = 2\gamma$ als Linienbreite.

Vertrauensintervall: $\int_{-\Gamma/2}^{\Gamma/2} f(x) dx = 50\%$.

CDF: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x') dx' = \frac{1}{\pi} \operatorname{atan}\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}$.

Suche anhand einer Stichprobe die optimalen Parameter einer Verteilung bzw. Funktion

→ Anpassung der Verteilung/Funktion an die Stichprobe/Messwerte durch Optimierung

2 wichtige Verfahren:

- ▶ **Maximum Likelihood-Methode** [ML] → s. Kapitel 18.2.1
- ▶ **Kleinste-Quadrate-Methode** (*least square*, LS) s. Kapitel 9.6

Kleinste-Quadrate-Methode

Anpassung (*fit*) einer Modellfunktion an (Mess-)Daten durch Optimierung der Modellparameter

n Messwerte $y_i(x_i)$ ($i = 1, \dots, n$)

Modellfunktion: $f(x; \underbrace{\alpha_1, \dots, \alpha_m}_{\alpha, \text{Modellparameter}})$

Suche Parameter, sodass die Abweichungen (Residuen) möglichst klein sind.

$$\min_{\alpha} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i, \alpha))^2 = \min_{\alpha} \sum_{i=1}^N r_i^2(\alpha) = \min_{\alpha} \chi^2(\alpha). \quad (1)$$

Lineare Anpassung: Modellfunktion ist linear

($f(x; a, b) = a + bx$) $\rightarrow$. Optimale Parameter lassen sich direkt berechnen. ($\rightarrow$ Kapitel 9.6.1)

Polynomregression: Modellfunktion ist ein Polynom ($\rightarrow$ Kapitel 9.6.2)

Polynomapproximation: Anpassung einer bel. Funktion mit einem Polynom ($\rightarrow$ Kapitel 18.2.2)

Allgemeiner Fall: **Nichtlineare Anpassung**

Lösung des Optimierungsproblems für eine allg. Modellfunktion mithilfe von Minimierungsmethoden der Linearen Algebra

(→ Kapitel 18.2.3)

[Für Experten:]

Minimierung durch Anwendung des (mehrdimensionalen) Newton-Verfahrens auf den Gradienten der Modellfunktion. Bei Verwendung von $\chi^2(\alpha)$ ergibt sich das **Gauß-Newton-Verfahren**. Um die Konvergenz zu garantieren, führt man einen Parameter λ ein und erhält endlich den **Levenberg-Marquardt-Algorithmus**.

(→ Kapitel 11.3)

In Python:

```
scipy.optimize.curve_fit(f,x,y) → popt,pcor
```

Andere Programme mit Fitfunktionen: Gnuplot, Origin, LabPlot, Igorpro, ...